

Fichas descriptivas de pesca deportiva



"Bienvenidos a Bahía de los Ángeles, un Área Marina Protegida. Como comunidad procuramos la pesca de captura y liberación para conservar nuestros recursos"



"Welcome to Bahía de Los Ángeles - a Marine Protected Area. As a community, we promote catch-and-release fishing to conserve our resources"

欢迎来到海洋保护区。作为社区，我们实行捕捞和释放渔获的方式，以保护我们的水生资源。



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA



Uso

El prestador de servicios como el usuario tendrá mayor conocimiento sobre las especies de principal interés dentro de la Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, donde obtendrá apoyo visual y técnico de sus fechas de captura, cuota máxima recomendada, así como sus tallas.

Importancia

El Área Natural Protegida Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes se encuentra dentro de una de las zonas con mayor productividad primaria del Golfo de California, cuyas aguas mantienen grandes poblaciones de peces endémicas y migratorias para el uso de refugio, alimentación, descanso y reproducción.

El tener un manejo de las especies capturadas proporcionará que el ANP se pueda mantener sano.

El permiso se otorga en base a una evaluación de 10 puntos. Con esta propuesta, buscamos garantizar la preservación de los recursos en el Área Natural Protegida, asegurando la continuidad de una actividad saludable a largo plazo.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



**BAJA
CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA



**pro
natura**
N O T O E S T E

Reglas para la pesca deportiva

- Contar con el permiso correspondiente.
- No realizar pesca en zonas o temporadas de veda.
- Para especies marinas, el límite de captura es de 10 individuos en total de cualquier especie y 5 máximo de una sola especie. Algunas especies tienen límites distintos, por ejemplo: Dorado, pez gallo y baya, dos individuos por especie, pero cuenta como cinco al total diario de todas las especies.
- Los picudos como el marlin, vela o espada, un solo individuo por especie y cuenta como cinco al total diario de todas las especies.
- A menos que se consuman a bordo y/o sean picudos, todos los peces deben ser desembarcados enteros, no fileteados, pero sí pueden ser eviscerados.
- Registrar la información de su captura o apoyar al prestador de servicio para que realice este registro usando la bitácora oficial.

Existen más reglas, si tienes dudas, ¡acércate a nosotros!



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura



Aguado (Bocón)

Jawfish




Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

**Bocón punteado y
bocón gigante**

Opistognathus punctatus / *Opistognathus rhomaleus*



Bocón punteado
Opistognathus punctatus

Bocón gigante
Opistognathus rhomaleus



Cuota
Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo
Hasta 40.6 cm / 51 cm

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- **Adultos:** Color gris claro o café claro, con numerosos puntos pequeños oscuros en la cabeza y el cuerpo, manchas más grandes, negras en el costado y las aletas.
- **Juveniles:** Tienen menos manchitas y más grandes; conforme crecen, los juveniles aumentan el patrón de moteado; las pectorales de los juveniles claras, más manchado con la edad; los juveniles menores de 15 cm con una mancha negra alargada en la mitad de la dorsal entre las espinas 4ta-8ta, esta mancha es un ocelo en individuos muy pequeños; adentro de la mandíbula inferior de macho con 2 manchas negras en forma de V.
- Es una de las especies endémicas del Golfo de California y es considerada una especie de ornato.

Hábitat

Fondos de arena y rocas.

Distribución

La especie se desplaza a lo largo de la costa mexicana, desde el Golfo de California hasta el Pacífico, abarcando toda la extensión de la Península de Baja California y región suroeste de México.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
NO ROSTRE

Baqueta ploma

Star-studded grouper

Hyporthodus niphobles



Lista Roja de la UICN

En peligro

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Baqueta ploma



Cuota

Se recomienda 3
ejemplares por permiso
Máximo 5 individuos por
permiso



Tamaño máximo

Hasta 121 cm y 24.5 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- **Adulto:** Color café a rosa rojizo; color de las aletas desvaneciéndose a café oscuro con un bigote negro arriba de la mandíbula superior.
- **Juvenil:** Color café oscuro, con manchitas azules irregulares en el cuerpo que forman líneas verticales en la parte posterior del cuerpo, con varias líneas azules del ojo hacia abajo y detrás sobre el opérculo, con bigote negro sobre la mandíbula superior. Los juveniles tienden a estar en aguas más someras.

Hábitat

Sitios costeros, arrecifes y fondos suaves

Distribución

La especie se desplaza a lo largo de la costa mexicana, desde el Golfo de California hasta el Pacífico, abarcando toda la extensión de la Península de Baja California y región suroeste de México.



Zona de distribución en México

Bahía de Los Angeles, Baja California



1 - 450 metros

Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
NO FOSTE

Barracuta

Pacific Barracuda

Sphyraena argentea

 Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)
Barracuda plateada



Cuota
Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo
Hasta 145 cm y 12 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

 Permitido

 Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Parduzco a azulado por encima, algunas veces con barras oblicuas tenues sobre el dorso, plateado por debajo; línea lateral oscura; aleta caudal con radios grises y membranas amarillentas.

Hábitat

Costero y oceánico, cerca del fondo hasta la superficie.


Distribución

La especie pelágica costera realiza sus desplazamientos a lo largo de la Península de Baja California, alcanzando la región este del Golfo de California y las Islas de Revillagigedo.



■ Zona de distribución en México

📍 Bahía de Los Angeles, Baja California



0 - 18 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
N O R O E S T E

Barrilete

Skipjack tuna

Katsuwonus pelamis



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Barrilete listado



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Alcanza 120 cm; 34.5 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- Azul púrpura oscuro en el dorso; parte inferior de los costados y el vientre plateado, con 4-6 franjas onduladas conspicuas o líneas discontinuas de puntos oscuros.
- Es considerado el atún más importante a nivel mundial siendo muy popular en la cocina japonesa.

Hábitat

Pelágico oceánico.

Distribución

La distribución de la especie es amplia en mares templados y tropicales. Realiza una migración circunglobal, habitando en aguas con temperaturas superiores a los 15°C. En México, su presencia se extiende desde el sur de California hasta la entrada del Golfo de California, así como en el Golfo de México.



0 a 596 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
NO ROSTRE

Baya

Gulf grouper

Mycteroperca jordani



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Baya



Cuota

Máximo 1 individuo por permiso y contarán como cinco individuos del total de la cuota diaria.



Tamaño máximo

Hasta 198 cm y 91 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características


- **Adultos:** Color café-gris o con manchas oblongas grandes de café ceniza sobre el dorso y líneas difusas café que radian desde el ojo; aletas medias con un exterior oscuro y un margen angosto blancuzco.
- **Juveniles:** Color gris o café gris, con manchas oblongas grandes de café ceniza en el dorso y líneas difusas café que radian desde el ojo.

Hábitat

Arrecifes rocosos, usualmente debajo de 30 m de profundidad durante el verano, pero en aguas más someras durante el resto del año.

Distribución

La especie se desplaza hacia el sur de la península de Baja California y Baja California Sur, así como en el Golfo de California.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA



pro natura

NOROESTE

Blanco

Ocean whitefish

Caulolatilus princeps



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Blanco del Pacífico



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 102 cm y 6 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Generalmente color gris azulado; una franja azul a lo largo de las aletas dorsal y anal; aleta pectoral azul, con una franja amarilla en el centro; aleta caudal amarillenta.

Es una especie endémica del Océano Pacífico que puede vivir hasta 13 años.

Hábitat

Zonas de arrecifes con fondos marinos arenosos, fangosos o rocosos

Distribución

La especie realiza su desplazamiento en aproximadamente los tres cuartos inferiores del Golfo de California.

En México vive principalmente en las costas de oeste de la península de Baja California.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA



pro natura

NOROESTE

Bonita

Striped bonita

Sarda orientalis



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Bonito



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta **117 cm**; registro
mundial en pesca
deportiva **10.65 kg**

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Dorso y costados color azul metálico, con 8-11 franjas oscuras, ligeramente oblicuas, las franjas inferiores en líneas interrumpidas; parte inferior de los costados y el vientre plateados; 2da aleta dorsal completamente negra.

Hábitat

Pelágico en aguas costeras y oceánicas.

Distribución

La especie realiza su desplazamiento desde el Golfo de California y el sureste del Océano Pacífico.



0 - 30 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
N O T O S T E

Cabrilla sardinera

Leopard grouper


Mycteroperca rosacea



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Cabrilla sardinera



Cabrilla sardinera



Cabrilla reina



Cuota

Se recomienda soltar la cabrilla reina, si cualquiera de las dos se encuentra ahuevada o con huevera (sardinera o reina) y si cualquiera es talla menor a los 35cm

Máximo 5 individuos por permiso

Tamaño máximo registrado

Hasta 100 cm y 12.2 kg



Temporada de pesca en Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Mayo y junio soltar si esta ahuevada*

Características

- Coloración de los juveniles pequeños canelo claro a casi blancuzco, con manchas café bastante espaciadas; el manchado se vuelve más denso en los adultos, en los cuales la coloración de fondo es verdusca a café gris; en la mitad superior del cuerpo con frecuencia se presenta una serie de manchas en su lomo superior, con franjas blancuzcas y angostas entre ellas.
- Existen individuos ocasionales (alrededor de 1% de la población) de color amarillo dorado, algunas veces con parches pequeños de pigmentación oscura.
- Alcanza una edad máxima de 17 años.

Hábitat

Áreas rocosas en aguas poco profundas

Distribución

La especie se desplaza a lo largo del área que comprende el Golfo de California y el Pacífico mexicano, frente a las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
NO FOSTE

Cabrilla arenera

Spotted sand bass

Paralabrax maculatofasciatus



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Cabrilla arenera



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Alcanza 58 cm y 3 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características


- **Adultos:** Cabeza y cuerpo gris pálido, con numerosos puntos pequeños de negro, café y anaranjado, que a veces se juntan para formar líneas oscuras en la parte inferior del cuerpo; 6-7 barras oscuras indistintas y largas en el costado; una barra oblicua del ojo a la esquina inferior del opérculo; dorsal blanda, aleta caudal y aleta anal densamente punteadas.
- **Juveniles:** Densamente punteado y con una línea oscura del ojo hasta la aleta caudal; un serie de barras oscuras cortas en la parte inferior del cuerpo.

Hábitat

Arrecifes planos, generalmente cubiertos por vegetación, adyacentes a fondos arenosos.

Distribución

La especie se distribuye de las costas de Monterey, California a Cabo San Lucas, B.C.S. incluyendo el Golfo de California y Mazatlán, Sin.; aunque es menos común en la parte Sur del Golfo.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca y Acuicultura

pro natura
NOTOESTE

Cabrilla extranjera

Goldspotted sand bass

Paralabrax auroguttatus



Lista Roja de la UICN
Datos deficientes

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Cabrilla extranjera



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 71 cm

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Color cafesusco, llegando a blanco en el vientre; cabeza y costados cubiertos con numerosas manchas anaranjadas; dorso con dos a tres franjas angostas pálidas; revestimiento de la cavidad branquial anaranjado; juveniles color blanco con 3 bandas oscuras y una franja café claro o una fila de bandas longitudinales entre cada franja oscura; las franjas se convierten en manchas conforme crecen los individuos.

Hábitat

Fondos rocosos

Distribución

La especie se desplaza desde la parte central de Baja California hasta el Golfo de California, abarcando la región central de México.



-  Zona de distribución en México
-  Bahía de Los Angeles, Baja California



2 - 183 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
N O R O E S T E

Cochito

Finescale triggerfish

Balistes polylepis



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Cochi



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 80 cm

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Café oliva a gris-azul pálido uniforme, sin marcas distintivas.

Los adultos son dormesales y los juveniles pelágicos.

Hábitat

Arrecifes rocosos, con frecuencia se le observa sobre áreas adyacentes de arena o piedras; algunas veces anda en grupos.

Distribución

La especie realiza su desplazamiento desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de California.



Zona de distribución en México

Bahía de Los Angeles, Baja California



3 - 512 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
N O R O E S T E

Curvina (tabacucha)

White weakfish

Atractoscion nobilis



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Corvina blanca



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 166 cm y 38 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- **Adultos:** De azul metálico a color cobre en la parte superior, con motas oscuras; barriga plateada; base interna de la pectoral con mancha negra.
- **Juveniles:** Con 3-6 barras oscuras en la parte dorsal superior, aletas amarillo-morenas.

Hábitat

Hábitat rocoso y fondos con algas.

Distribución

La especie lleva a cabo su migración desde Alaska hasta el Golfo de California, abarcando el Océano Pacífico y parte del suroeste de México.



Zona de distribución en México

Bahía de Los Angeles, Baja California



1 - 125 metros

Profundidad



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA



pro natura

NOROESTE

Dorado


Common dolphinfish

Coryphaena hippurus

Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Dorado



Cuota

Máximo 2 individuos por permiso y contarán como cinco individuos del total de la cuota diaria.



Tamaño máximo registrado

Alcanza 2.3 m y 39.6 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Características

Color verde azul brillante metálico en el dorso, desvaneciéndose a amarillo dorado ventralmente, con manchas dispersas verde azul iridiscntes; aleta dorsal verde azul profundo; aletas caudal, anal y pélvicas principalmente amarillas; juveniles pequeños color dorado con alrededor de 12 barras oscuras en el costado; la caudal con las puntas blancas y las pélvicas negras.

Hábitat

Hábitat pelágico en aguas costeras y oceánicas.

Distribución

La especie presenta una distribución circuntropical, abarcando todas las regiones de México.



Zona de distribución en México

Bahía de Los Angeles, Baja California



0 - 255 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca y Acuicultura

pro natura
NOROESTE

Jurel

Yellowtail amberjack

Seriola lalandi



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Jurel de la Baja



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta por lo menos 250
cm y 52 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- **Adulto:** Color azul en el dorso; costados y vientre plateado a blanco; una franja color bronce a lo largo de la parte media del cuerpo, transformándose a amarillo en la parte posterior; la mayoría de las aletas, incluyendo la caudal, amarillentas.
- **Juvenil:** Con numerosas barras angostas oscuras (un poco más anchas que los entre-espacios claros) que no se extienden sobre las aletas dorsal y anal.

Hábitat

Principalmente pelágico; forma grandes cardúmenes en aguas abiertas.

Distribución

La especie lleva a cabo desplazamientos de manera circuntropical en aguas templadas y subtropicales. En nuestra región, su movimiento se extiende desde el centro de México hacia el norte en las costas de la Península de Baja California y en el Golfo de California.

 Zona de distribución en México

 Bahía de Los Angeles, Baja California



0 - 300 metros

Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
N O T O S T E

Jurel toro

Pacific Crevalle Jack

Caranx caninus



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Jurel toro



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 100 cm y 17.7 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Dorso y costados color azul metálico, con 8-11 franjas oscuras, ligeramente oblicuas, las franjas inferiores en líneas interrumpidas; parte inferior de los costados y el vientre plateados; segunda aleta dorsal completamente negra.

Hábitat

Comúnmente en esteros.

Distribución

La especie realiza su desplazamiento desde el sur de California hasta el Golfo de California, abarcando toda la Península de Baja California.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura



Mero

Black sea bass

Stereolepis gigas



Lista Roja de la UICN

En peligro crítico

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Pescara o mero gigante



Cuota

Se recomienda 1 ejemplar por panga pero de preferencia hacer "Catch and Release".



Tamaño máximo

Hasta 270 cm y 256 kg

Temporada de pesca en Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

- **Adulto:** La cabeza y cuerpo gris o verdoso con manchas pálidas y puntos pequeños negruzcos dispersos sobre la parte superior de la cabeza, cuerpo y en la aleta pectoral.
- **Subadulto (< 100 cm):** Color verdoso a café claro con barras irregulares café más oscuro.
- **Juvenil:** La cabeza, dorsal blanda, pectoral, pélvica y aleta caudal con muchos puntos negros; el cuerpo con 5 barras negras oblicuas, extendiéndose sobre las aletas dorsal y anal; la caudal con una barra negra en la base.

Hábitat

Arrecifes rocosos, bahías, esteros y manglares.

Distribución

La especie se encuentra en fondos rocosos, asociados a arrecifes, sustratos con algas. Se desplaza a lo largo del Pacífico Oriental, abarcando las regiones suroeste y este central del Golfo de California.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
N O R O E S T E

Pargo huachinango

Red snapper

Lutjanus peru



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Huachinango del
Pacífico



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Hasta 95 cm

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Cuerpo ovalado; narinas frontal y posterior como huecos sencillos; adultos grandes desarrollan un surco desde el frente del ojo a las aberturas nasales, y el otro del ojo hacia atrás; boca relativamente grande y protráctil; dientes cónicos a caniniformes, aquellos al frente de las mandíbulas genítalmente son más grandes y en forma de colmillos; parche de los dientes en el centro del paladar en forma de diamante, con o sin una extensión de largo moderado.

Hábitat

Es un depredador nocturno de crustáceos y de peces pequeños, se esconde en arrecifes rocosos durante el día.

Distribución

La especie generalmente vive en aguas abiertas en fondos rocosos y arenosos. Realiza su desplazamiento a lo largo de la región sur de California hasta el Golfo de California.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA



pro natura

NOROESTE

Pez gallo

Roosterfish

Nematistius pectoralis



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Papagallo



Cuota

Máximo 2 individuos por permiso y contarán como cinco individuos del total de la cuota diaria.

Tamaño máximo

Hasta 191 cm y 51.7 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Cuerpo alargado, comprimido, cabeza puntiaguda; dientes simples, en bandas anchas en las mandíbulas, en el paladar; aleta dorsal con espinas, las últimas muy alargadas como filamentos, ninguna espina separada del resto de la aleta, su base mucho más corta que la base de la aleta dorsal; escamas pequeñas y lisas, alrededor de 130 en una serie lateral, no forma escudetes sobre la línea lateral.

Hábitat

Habita en costas arenosas, ocasionalmente en esteros.

Distribución

Habita en costas arenosas, ocasionalmente en esteros. La especie se desplaza desde el norte de Baja California hacia el suroeste y este del Golfo de California.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
NOROESTE

Sierra

Pacific Sierra

Scomberomorus sierra



Lista Roja de la UICN
Preocupación menor

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Sierra del Pacífico



Cuota

Máximo 5 individuos
por permiso



Tamaño máximo

Alcanza 112 cm y al
menos 8.2 kg

Temporada de pesca en
Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características

Verde bronce a azul verdusco en el dorso, blanco plateado en la parte inferior de los costados y en el vientre; ~ 3-8 series de manchas redondas pequeñas naranjas en los costados; parte distal de la primera aleta dorsal negro, parte adentro blancuzco; aletas pectorales cenizas.

Hábitat

Vive en cardúmenes en aguas costeras.

Distribución

La especie tiene una distribución tropical y subtropical.

En México va desde la península de Baja California y Golfo de California hasta las costas de Chiapas.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP

COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA

SECRETARÍA DE PESCA
Y ACUICULTURA

pro natura
NO ROSTRE

Vieja

California sheephead

Semicossyphus pulcher



Lista Roja de la UICN

Vulnerable

Nombre ENCICLOVIDA (CONABIO)

Vieja californiana



Hembra



Macho



Cuota

Se recomienda 3 ejemplares por panga pero de preferencia hacer "Catch and Release".



Tamaño máximo

Hasta 91 cm y 16 kg

Temporada de pesca en Bahía de Los Ángeles

■ Permitido

■ Veda

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Características


Fl: Rojo cafesusco a color rosa con el mentón blanco; FT: Con la cabeza negra y el mentón blanco, rosado a rojo cenizo en la sección intermedia y porción posterior del cuerpo color negro; los juveniles color naranja rojizo con una franja blancuzca medio lateral y manchas negras grandes en las aletas dorsal, anal y pélvicas, y también la base de la aleta caudal.

Hábitat

Habita entre algas gigantes feofíceas, en costas rocosas y arrecifes.

Distribución

La especie se desplaza a lo largo de la península de Baja California, abarcando toda la extensión del Océano Pacífico y el Golfo de California.



1 - 150 metros
Profundidad



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

pro natura
N O R O E S T E

Para cualquier aclaración, ¡contáctanos!

Juntos podemos tener una pesca deportiva sostenible.



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura



Asesoría

- Rosalía Avalos Tellez
- Sugey Adela Aztorga Pacheco
- José Missael Murillo Martínez
- Ricardo Igor Galván Jiménez
- Prestadores de Servicios Turísticos de Pesca Deportiva de Bahía de los Ángeles

Fuentes

- Smithsonian - Tropical Research Institute (Scientific Database)
- Scientific Databases | Smithsonian Tropical Research Institute (si.edu)
- Shorefishes - Homepage (si.edu)
- Enciclovida (CONABIO)



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONANP
COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

PESCA
Secretaría de Pesca
y Acuicultura

